




FICHES D'IDENTIFICATION DES ARBRES ET ARBUSTES

Lorsque vous recevrez et planterez les jeunes arbres et arbustes, vous n'aurez que les bourgeons pour vérifier l'espèce que vous recherchez. C'est possible, mais difficile. Vous avez un peu de patience ou vous n'arrivez pas à trouver l'espèce ? Attendez alors le printemps pour observer les feuilles et la floraison.

Vous pouvez examiner les caractéristiques de la feuille, du bourgeon, de l'écorce, de la fleur et du fruit pour déterminer l'espèce que vous avez devant vous.

LES CARACTÉRISTIQUES D'UNE FEUILLE



LA POINTE DE LA FEUILLE
pointue, ronde, incisée...


LA TAILLE

BORD DE LA FEUILLE


SURFACE DE LA FEUILLE
rugueuse, poilue, lisse

COULEUR

PÉTIOLE
long, court, coloré...



CARACTÉRISTIQUES D'UN BOURGEON



LE FORMAT
pointu, étroit, large...

LA TAILLE

LA COULEUR


AUTRES CARACTÉRISTIQUES
poilu, chauve, collant...

L'ÉCORCE

L'écorce présentée dans ces fiches est celle d'une plante mature et sera quelque peu différente de celle de vos petites tiges, qui sont aussi épaisses qu'un petit doigt lorsque vous les recevez. Sur certaines d'entre elles, vous pouvez en observer quelques caractéristiques ou la voir apparaître après un an.



Merisier *Prunus avium*



Écorce brune lisse avec des lignes horizontales.



bourgeons floraux groupés sur des pousses courtes de manière à ce que les bourgeons soient proches les uns des autres.



Période de floraison : avril - mai

Fleurs blanches parfumées de 2,5 cm en ombelles courtes et pédonculées. C'est l'un des plus beaux arbres indigènes à fleurs.



Le fruit est une drupe qui contient une graine dure.

Il mesure 1 à 2 cm, est rond, rouge ou noirâtre, sucré et possède un long pédoncule brun-rouge.

C'est la forme sauvage des cerises que nous pouvons acheter dans les magasins.



Charme commun *Carpinus betulus*



Période de floraison : avril - mai

Les fleurs sont appelées chatons. Il y a des fleurs mâles et des fleurs femelles. Elles ressemblent à de longues et fines ficelles et sont quelque peu similaires aux chatons du noisetier et de l'aulne glutineux.




L'écorce est fine, grise avec des rayures, des stries verticales et souvent argentée.



Les fruits sont des samares avec une feuille à 3 lobes (2 - 3 cm), celui du milieu étant le plus long. Ils pendent en grappes et sont mûrs à la fin du mois de septembre.



Bouleau verruqueux *Betula pendula*



Période de floraison : avril – mai
Les fleurs sont appelées chatons.



Écorce blanche avec de grandes pastilles noires.

Les feuilles se détachent horizontalement. A la base, il y a souvent des fissures profondes.

chatons mâles : non pédonculés, jaunes, 3 cm, se trouvent à l'extrémité des rameaux, semblent être des fils pendants




les chatons femelles : sur des tiges ramifiées, ils sont verts et dressés



Les fruits sont des samares regroupées en chatons. Ils mesurent 2 à 3 cm et sont suspendus à un pédoncule de 1 cm. Ils sont d'abord verts, puis bruns. Lorsqu'ils sont mûrs, les chatons se désintègrent en samares ailées.



Érable champêtre *Acer campestre*



a 5 grands lobes avec une pointe émoussée et parfois les lobes sont à nouveau lobés avec des courbes pointues



écorce fendue et liégeuse

Période de floraison : mai - juin



Les fleurs sont vert jaunâtre et forment des ombelles. Elles apparaissent en même temps que les feuilles.



Le fruit se compose de deux graines (Samare double), chacune dotée d'une "aile". Lorsqu'elles tombent, elles tournent dans l'air comme un hélicoptère.



Orme champêtre *Ulmus minor*



Période de floraison : mars - avril

La floraison a lieu avant l'apparition des feuilles. Les fleurs sont rouges et se présentent en grappes rouges.





L'écorce est brun foncé et liégeuse.



Les fruits sont des samares ailées avec une touche de rouge au milieu.



Sureau noir *Sambucus nigra*



Période de floraison : mai - juin

Les fleurs sont petites, blanches et ont un parfum doux. Elles forment des ombelles blanches.



L'écorce est jaune-brun avec des rainures verticales.

© Paul Busselen




à l'intérieur des rameaux se trouve une moelle blanche et molle



Fruits : petites baies noires en grappes.
Non comestibles.



Sorbier des oiseleurs *Sorbus aucuparia*



bord dentelé

elliptique à
lancéolé

Feuille composée de
9 à 17 folioles

gros bourgeon

1 - 2 cm

remarquablement
blanc

long-ovale

rameaux dénudés
et brun-gris avec
des lignes ovales
brunes



Écorce grise et brillante avec de
subtiles lignes horizontales
brunes.



Période de floraison : mai
Fleurs blanches (jaunâtres) de 1 cm de diamètre.
Les fleurs forment des ombelles.




Les fruits sont rouge-
oranges à maturité et
pendent en grappes.

Ils sont globuleux,
charnus et mesurent de 6
à 10 mm.

**Les baies sont
comestibles uniquement
après une longue
cuisson.**



Prunellier *Prunus spinosa*



Écorce brune avec des lignes horizontales plus claires.



Période de floraison : avril – mai
Petites fleurs blanches.
Fleurit avant l'apparition des feuilles.




Le fruit est une drupe de couleur bleuâtre, souvent avec un voile blanc, de forme globulaire et de petite taille (6 - 12 mm).

Comestible mais âpre.



Cornouiller sanguin *Cornus sanguinea*



Les branches plus anciennes sont cendrées, verdâtres ou rougeâtres, lisses ou peu fissurées. Les branches plus jeunes sont lisses, parfois vertes brillantes mais surtout rouges.

Période de floraison :
Mai – juin
Parfois, ils fleurissent une deuxième fois en automne.

Les fleurs sont blanches et regroupées en grappes. Les fleurs apparaissent après les feuilles.



Les fruits sont petits (5 mm), globuleux et bleu-noir.

Non comestibles.



Rosier des chiens *Rosa canina*



● bord de la feuille denté en scie

ovoïde ou elliptique

5 - 7 folioles

Brindilles avec épines.

Les vieux rameaux sont bruns, les jeunes sont verts.

Le fruit est un cynorrhodon, de grande taille, rouge et ovale.

Période de floraison : juin
Les fleurs parfumées sont blanches, blanches-roses ou roses.



© Vildaphoto, Rollin Verlinde