




PLANTENPAKKET 1 – DROGE GROND

KENMERKENFICHES BOMEN EN STRUIKEN

Als je de jonge bomen en struiken aankrijgt en plant zal je alleen de knoppen hebben om na te gaan naar welke soort je aan het kijken bent. Dit is mogelijk, al is het een uitdaging. Heb je wat geduld of vind je de soort niet? Wacht dan de lente af zodat je ook de bladeren en de bloei kan bekijken.

Je kan kijken naar kenmerken van het blad, de knop, de schors, de bloem en de vrucht om erachter te komen welke soort je voor je hebt.

KENMERKEN VAN EEN BLAD



KENMERKEN VAN EEN KNOP





DE SCHORS

De schors die in deze fiches wordt getoond is die van een volwassen plant en zal er wat anders uitzien dan bij jullie stammetjes die zo dik zijn als een pink wanneer jullie ze aankrijgen. Bij sommige kan je er wel enkele kenmerken van waarnemen of kan je ze na één jaar zien verschijnen.



BOSKERS *Prunus avium*



Gladde bruine schors met horizontale lijnen.



bloemknoppen gegroepeerd op kortloten waardoor de knoppen dicht bij elkaar staan.



Bloeiperiode: april – mei


Heeft witte geurige bloemen van 2,5 cm die in korte gesteelde schermen staan. Het is een van de mooiste bloeiende inheemse bomen.

De vrucht is een steenvrucht en bevat een harde pit. Hij is 1 – 2 cm groot, rond, rood of zwartachtig, zoet en heeft een lange roodbruine steel.

Dit is de wilde vorm van de kersen die we in de winkel kunnen kopen om te eten.



HAAGBEUK *Carpinus betulus*



De bloemen worden katjes genoemd. Ze hebben zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen. Ze zien eruit als dunne, lange sliertjes en lijken wat op de katjes van hazelaar en zwarte els.





De schors is dun, grijs met strepen, verticale richels en vaak zilverachtig glanzend.



De vrucht is een klein nootje met een schudblaadje (2 – 3 cm) met 3 lobben waarvan de middelste het langste is. Ze hangen in trossen bij elkaar en zijn rijp eind september.



RUWE BERK *Betula pendula*



Bloeiperiode: april – mei

De bloemen worden katjes genoemd.



Witte schors met grote zwarte ruiten. Bladdert horizontaal af. Aan de voet vaak diepe scheuren.

mannelijke katjes: ongesteeld, geel, 3 cm, zitten op het uiteinde van de twijgen, lijken hangende sliertjes




vrouwelijke katjes: zitten op vertakte steel en zijn groen en rechtopstaand



De vrucht heet een vruchtkatje. Ze zijn 2 – 3 cm en hangen aan een steeltje van 1 cm. Ze zijn eerst groen, nadien bruin. Wanneer rijp valt het katje uiteen in schudblaadjes en gevleugelde nootjes.



VELDESDOORN *Acer campestre*



heeft 5 grote lobben met stompe punt en soms zijn de lobben nogmaals gelobd met spitse bochten



jonge takken bruin en glad



vaak richels (kurklijsten) in de lengte op twijgen



gespleten, kurkachtige schors

Bloeiperiode: mei - juni




Bloemen zijn geelachtig groen en vormen schermachtige trossen. Verschijnen tegelijk met de bladeren.



De vrucht bestaat uit twee zaden met elks een 'vleugel'. Wanneer ze naar beneden vallen tollen ze door de lucht als een helikopter.



VELDIEP *Ulmus minor*



Bloeiperiode: maart – april

Bloeit voordat de bladeren er zijn. De bloemen zijn rood en staan in rode trossen.





De schors is donkerbruin en kurkachtig.



De vruchten zijn gevleugelde nootjes met een rode toets in het midden.



GEWONE VLIER *Sambucus nigra*



Bloeiperiode: mei – juni

De bloemen zijn klein, wit en hebben een zoete geur. Ze vormen witte schermen.



Schors is geelbruin met verticale groeven.

© Paul Busselen




binnenin de twijgen bevindt zich een wit, zacht merg



Vrucht: kleine, zwarte bessen in trossen
Niet eetbaar.



LIJSTERBES *Sorbus aucuparia*



Grijze, glimmende schors met subtiële bruine horizontale lijnen.



Bloeiperiode: mei
Gelig witte bloemen van 1cm doorsnede.
De bloemen vormen schermen.




De vruchten zijn oranjerood als ze rijp zijn en hangen in trossen.

Ze zijn bolvormig, vlezig en zijn 6-10 mm groot.

Alleen eetbaar na lang koken.



SLEEDOORN *Prunus spinosa*



Bruine schors met lichtere horizontale lijnen.



Bloeiperiode: april - mei
Kleine witte bloemen.
Bloeit voordat er bladeren zijn.






© Vilda/Yves Adams

De vrucht is een steenvrucht en is blauwachtig, vaak met witte was, bolrond en klein (6 – 12 mm).

Eetbaar maar bitter.



RODE KORNOELJE *Cornus sanguinea*



Oudere takken zijn asgriuw, groen- of roodachtig, glad of weinig gescheurd. Jongere takken zijn glad, soms glanzend groen maar meestal rood.

Bloeiperiode:
mei – juni
soms bloeien ze nog een tweede keer in de herfst.

Bloemen zijn wit en verzameld in trossen. De bloemen verschijnen na de bladeren.



De vruchten zijn klein (5 mm), bolronde en blauwzwart.

Niet eetbaar.



HONDSROOS *Rosa canina*



bladrand gezaagd

eirond of ellips
vormig

5 – 7 deelblaadjes

Twijgen met doorns.

De oudere twijgen zijn
bruin, de jonge groen.

Bloeiperiode: juni

De geurende bloemen zijn wit, wit-rose tot roze.

De vrucht is een
rozenbottel en is groot,
rood en ovaal.



© Vildaphoto, Rollin Verlinde

